

کندو

kandoo.cn.com



اخبار / مقالات / بانک سوال / فروشگاه

با عضویت در سایت ما

نیاز به عضویت در هیچ سایت کنکور دیگری را ندارید

برخی از خدمات ویژه سایت ما:

- ✓ ارسال آخرین اخبار کنکور از طریق ایمیل به صورت **کاملاً رایگان**
- ✓ ارسال آخرین اخبار کنکور از طریق پیامک (**سالانه ۲۰۰۰ تومان**)
- ✓ رایبه دهنده نمونه سوالات کنکور همه رشته ها به صورت رایگان

با ما با خیالی راحت به سراغ کنکور بروید

چنانچه نمونه سوالی را پیدا نمی کنید

در قسمت "تماس با ما" درخواست دهید تا در اولین فرصت در اختیار شما قرار گیرد

189

F

نام

نام خانوادگی

محل امضاء



189F

صبح جمعه

۹۱/۱۲/۱۸

دفترچه شماره ۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.

امام خمینی (ره)

آزمون ورودی
دوره‌های دکتری (نیمه متمرکز) داخل
در سال ۱۳۹۲

رشته‌ی
زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی (کد ۲۴۳۲)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی گیاهان زراعی، زنتیک و آمار، اصول و مبانی زراعت، زراعت تکمیلی، فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی، فیزیولوژی رشد و نمو و جذب و متابولیسم)	۸۰	۱	۸۰

اسفندماه سال ۱۳۹۱

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب سزاوار نیست.

حق چاپ و تکثیر سؤالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با منحل شدن برابر مقررات رفتار می‌نماید.

- ۱- در چرخه TCA، طی تبدیل سوکسینیل - کوآ به سوکسینات، ADP به ATP تبدیل می شود به این فرایند می گویند.
 (۱) فسفوریلاسیون سوپراتری (۲) فسفوریلاسیون آنزیمی (۳) فسفوریلاسیون توری (۴) فسفوریلاسیون اکسیداسیونی
- ۲- کدام مرحله از تنفس سلولی امکان ادامه حیات سلول گیاهی در شرایط بی هوازی را میسر می سازد؟
 (۱) گلیکولیز
 (۲) مسیر پنتوز فسفات
 (۳) چرخه اسید سیتریک (TCA)
 (۴) زنجیره انتقال الکترون در غشاء داخلی میتو کندری
- ۳- در تخلیه آپوپلاستی قند به سلول مخزن
 (۱) چون مسیر آپوپلاستی است نیاز به انرژی ندارد.
 (۲) عبور از غشاء پلاسمائی ضروری است.
 (۳) چون آپوپلاستی است عبور از غشاء ضرورت ندارد.
 (۴) عامل اصلی ورود قند به سلول مخزن شیب غلظت ناشی از متابولیزم قند در مخزن است.
- ۴- در یک کلروفیل برانگیخته شده در اثر جذب نور، کدام فرایند بعدی انرژی نور را به انرژی شیمیایی تبدیل (ذخیره) می کند؟
 (۱) انتقال الکترون به وضعیت سینگلت ۱ و دفع انرژی به صورت حرارت
 (۲) انتقال الکترون از یک گیرنده به رنگدانه
 (۳) ساطع شدن فوتون نوری از رنگدانه (فلوروسنس)
 (۴) انتقال الکترون از رنگدانه به یک گیرنده
- ۵- شناخت مکانیزم های تخلیه (Unloading) و بهبود آن با کدام دستاورد در تولیدات کشاورزی بیشتر مرتبط است؟
 (۱) افزایش بیوماس (زیست توده)
 (۲) افزایش راندمان مصرف آب
 (۳) افزایش شاخص برداشت
 (۴) افزایش کیفیت محصول
- ۶- در فرایند جوانه زنی بذر یک غله کدام یک از هورمون های زیر کمتر نقش دارد؟
 (۱) جیبرلین (۲) اکسین (۳) سیتوکینین (۴) اتیلن
- ۷- اگر تمام شرایط ثابت و مشابه باشد چنانچه در یک مزرعه، LAI به ۵۰٪ تقلیل یابد، برای دو برابر شدن سرعت رشد محصول زراعی، چه باید کرد؟
 (۱) سرعت جذب خالص (NAR) دو برابر شود.
 (۲) سرعت جذب خالص (NAR) سه برابر شود.
 (۳) سرعت جذب خالص (NAR) چهار برابر شود.
 (۴) سرعت جذب خالص (NAR) پنج برابر شود.
- ۸- کدام یک جزء اجزاء ذخیره ای و ساختمانی سلول نیست؟
 (۱) نشاسته (۲) فسفولیپید (۳) سلولز (۴) همی سلولز
- ۹- کدام یک از گیاهان زیر در غلظت کمتری از CO₂ در محیط، فتوسنتز انجام می دهند؟
 (۱) ذرت (۲) کرچک (۳) تنباکو (۴) آفتابگردان
- ۱۰- کینازها و فسفاتازها آنزیم هایی هستند که به ترتیب باعث و پروتئین ها شده و به نوبه خود باعث و شدن آنها می شوند.
 (۱) دفسفریلاسیون، فسفریلاسیون - غیر فعال، فعال
 (۲) دفسفریلاسیون، فسفریلاسیون - فعال، غیر فعال
 (۳) فسفریلاسیون، فسفریلاسیون - غیر فعال، فعال
 (۴) فسفریلاسیون، فسفریلاسیون - فعال، غیر فعال
- ۱۱- مهم ترین عامل جذب آب در مراحل اولیه جوانه زنی بذر آن است که ناشی از است.
 (۱) پتانسیل اسمزی - مواد محلول درون بذر
 (۲) پتانسیل فشاری - فشار مثبت ناشی از مواد ذخیره بذر
 (۳) پتانسیل آبی - منفی بودن بیش از حد پتانسیل آبی
 (۴) پتانسیل ماتریک - کلونیدهای نشاسته و دیواره های سلولی
- ۱۲- گیاهان C₄ کربنه برای تثبیت هر مولکول CO₂ به بیشتری نیاز دارند، زیرا
 (۱) رویسکو - تثبیت CO₂ در سلول های غلاف آوندی نیاز به این آنزیم دارد.
 (۲) PEP - احیای CO₂ در سلول های غلاف آوندی نیاز به این آنزیم دارد.
 (۳) ATP - تغلیظ CO₂ در سلول های غلاف آوندی نیاز به مصرف انرژی دارد.
 (۴) ATPADPH - تثبیت CO₂ در سلول های غلاف آوندی نیاز به انرژی احیایی دارد.
- ۱۳- ترازولیوم آزمونی است که در تشخیص مورد استفاده قرار می گیرد.
 (۱) درصد بذرهای در حال خواب (۲) درصد قابلیت حیات
 (۳) درصد سکون بذر (۴) درصد جواز زنی

- ۱۴- آزمایش مزلسون و استال برای اثبات کدام پدیده ژنتیکی انجام گرفته است؟
 (۱) معرفی تکنیک نشاندار کردن ماده ژنتیکی
 (۲) همانندسازی مولکول DNA
 (۳) اثبات نوع ماده ژنتیکی در باکتری‌ها
 (۴) نحوه نسخه‌برداری از روی ژن
- ۱۵- رنگ چشم و رنگ پوست در انسان جزو صفات کیفی هستند یا کمی؟
 (۱) صفات کمی (۲) صفات شبه کمی (۳) صفات کیفی (۴) صفات شبه کیفی
- ۱۶- تولید چندین پروتئین از یک ژن در موجودات و به صورت رخ می‌دهد.
 (۱) یوکاریوتی - منوسیسترونک (۲) یوکاریوتی - پلی‌سیسترونک
 (۳) پروکاریوتی - پلی‌سیسترونیک (۴) پروکاریوتی - حذف یا نگهداری Exon
- ۱۷- شکل همانندسازی DNA در گیاه، باکتری و ویروس به ترتیب به صورت است.
 (۱) خطی - تتا - حلقه غلطان (۲) خطی - حلقه غلطان - تتا (۳) تتا - حلقه غلطان - خطی (۴) هیچ کدام
- ۱۸- محل همانندسازی DNA ژن‌های هسته در انسان توسط کدام یک از انواع DNA پلی‌مرازهای زیر انجام می‌شود؟
 (۱) α آلفا (۲) β بتا (۳) γ گاما (۴) σ سیگما
- ۱۹- اگر در یک جمعیت دارای تعادل هاردی واینبرگ درصد افراد دارای فنوتیپ غالب ۳۶٪ باشد درصد ناقلین بیماری در این جمعیت چقدر است؟
 (۱) ۲۴٪ (۲) ۳۰٪ (۳) ۴۸٪ (۴) ۶۴٪
- ۲۰- موجودی با ژنوتیپ BbHhEeNn خویش آمیزی می‌کند. نسبت فنوتیپی نتاج کدام است؟
 (۱) ۲۷:۹:۳:۳:۱ (۲) ۲۷:۹:۹:۳:۳:۱ (۳) ۲۷:۹:۹:۳:۳:۱ (۴) ۹:۳:۳:۱
- ۲۱- برای آزمون فرض همگنی واریانس دو تیمار از چه آزمونی استفاده می‌شود؟
 (۱) F (۲) توکی (۳) بارتلت (۴) کای اسکور
- ۲۲- چه رابطه‌ای بین میانگین‌های حسابی (\bar{x}) ، هندسی (\bar{x}_g) و همساز (\bar{x}_h) برقرار است؟
 (۱) $\bar{x}_g \leq \bar{x}_h \leq \bar{x}$ (۲) $\bar{x}_h \leq \bar{x}_g \leq \bar{x}$ (۳) $\bar{x}_h \leq \bar{x} \leq \bar{x}_g$ (۴) $\bar{x} \leq \bar{x}_g \leq \bar{x}_h$
- ۲۳- در آزمایشی با ۳ تیمار، اطلاعات زیر در دست است:

تیمار	تکرار	جمع
A	۵	۲۰
B	۴	۲۴
C	۶	۳۶

- واریانس بین گروه‌ها چقدر است؟
 (۱) ۴/۴۴ (۲) ۶/۶۶ (۳) ۱۳/۳۳ (۴) ۱۶/۲۱
- ۲۴- فراوانی تجمعی درصد برای عدد ۱۰ برابر با ۴۰٪ است کدام عبارت صحیح است؟
 (۱) ۴۰ درصد اعداد حداکثر ۱۰ می‌باشد. (۲) ۴۰ درصد اعداد حداقل ۱۰ می‌باشد.
 (۳) ۶۰ درصد اعداد حداکثر ۱۰ می‌باشد. (۴) ۶۰ درصد اعداد حداقل ۱۰ می‌باشد.
- ۲۵- در صورتی که $\sum x_i^2 = 200$ ، $n = 25$ و $\sum x_i = 50$ باشد حاصل عبارت $\sum (x_i - \bar{x})^2$ کدام است؟
 (۱) ۱۹ (۲) ۲۱ (۳) ۲۹ (۴) ۴۵
- ۲۶- در یک امتحان با ۲۰ سوال چهار جوابی، احتمال اینکه شخصی به تصادف به یک سوال جواب درست دهد چقدر است؟
 (۱) $5e^{-5}$ (۲) $(\frac{1}{4})(\frac{1}{20})$ (۳) $20(\frac{1}{4})(\frac{1}{4})^{19}$ (۴) $(\frac{1}{4})(\frac{1}{4})^{19}$
- ۲۷- در یک مسئله رگرسیون چنانچه مقادیر ثابت دو برابر شوند شیب خط
 (۱) دو برابر می‌شود. (۲) چهار برابر می‌شود. (۳) نصف می‌شود. (۴) تغییری نمی‌کند.
- ۲۸- کدام مورد تعریف دورمانسی یا خواب بذر می‌باشد؟
 (۱) همان رکود یا سکون بذر می‌باشد.
 (۲) عدم جوانه‌زنی بذر تحت شرایط نامساعد محیطی
 (۳) عدم جوانه‌زنی بذر تحت شرایط مساعد و نامساعد محیطی
 (۴) جوانه‌زنی بذر تحت شرایط مساعد محیطی و عدم جوانه‌زنی تحت شرایط نامساعد محیطی
- ۲۹- با افزایش مصرف کود نیتروژن دار نسبت کل ماده خشک تولید شده در گیاه زراعی به عملکرد دانه می‌یابد.
 (۱) افزایش (۲) کاهش (۳) گاهی افزایش و گاهی کاهش می‌یابد (۴) تغییری نمی‌کند

- ۳۰- گندم، ذرت، پنبه و یونجه به طور طبیعی جزء کدام گروه از گیاهان می‌باشند؟
 (۱) دگر بارور - خود بارور - دگر بارور - خود بارور
 (۲) خود بارور - دگر بارور - خود بارور - دگر بارور
 (۳) خود بارور - خود بارور - دگر بارور - دگر بارور
 (۴) دگر بارور - دگر بارور - خود بارور - خود بارور
- ۳۱- کدام یک از موارد زیر در ارتباط با کودهای آلی صحیح می‌باشد؟
 (۱) باعث بهبود ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک می‌گردند.
 (۲) حجم کمی از آن‌ها دارای مقادیر زیادی از عناصر غذایی می‌باشد.
 (۳) درصد عناصر غذایی موجود در آن‌ها نسبت به کودهای شیمیایی بیشتر می‌باشد.
 (۴) بلافاصله پس از مصرف به صورت محلول در آب درآمده و جذب گیاه می‌شوند.
- ۳۲- طول دوره رشد سریع سنبله در غلات بستگی به دارد که هرچه قدر باشد، مدت زمان را شامل می‌شود.
 (۱) نور، کمتر، کمتری (۲) دما، بیشتر، کمتری (۳) دما، بیشتر، بیشتری (۴) نور، بیشتر، بیشتری
- ۳۳- مقاوم‌ترین غلات نسبت به شوری و سرما به ترتیب و می‌باشند.
 (۱) یولاف - چاودار (۲) گندم - جو (۳) جو - سورگوم (۴) جو - چاودار
- ۳۴- در هر خوشه برنج گلچه و در هر گلچه آن پرچم وجود دارد.
 (۱) بیش از یک، ۳ (۲) بیش از یک، ۶ (۳) ۳، ۱ (۴) ۶، ۱
- ۳۵- گل آذین کدام یک از گیاهان زیر متفاوت از سایر گیاهان است؟
 (۱) جو (۲) گندم (۳) یولاف (۴) چاودار
- ۳۶- حساسیت گیاهان نسبت به افزایش تنش رطوبتی خاک در کدام شرایط زیر افزایش می‌یابد؟
 (۱) رطوبت نسبی کم (۲) سرعت زیاد باد (۳) درجه حرارت زیاد (۴) شدت نور کم
- ۳۷- در مرحله پر شدن دانه غلات، استرس کمبود آب کدام یک را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
 (۱) تعداد دانه (۲) تعداد سنبله (۳) تعداد سنبله‌ها (۴) وزن هزار دانه
- ۳۸- طول دوره رویش گیاهان زراعی بیشتر تحت تأثیر کدام عامل قرار می‌گیرد؟
 (۱) دمای محیط رشد (۲) میزان نور تابیده شده به کتوبی (۳) رطوبت قابل دسترس ریشه (۴) زمان کاشت گیاه
- ۳۹- در بین روش‌های مختلف خاک‌ورزی حفاظتی در دنیا، کدام روش با شرایط مناطق خشک ایران تطابق بیشتری دارد؟
 (۱) کلاشی (۲) بدون شخم (۳) شخم حداقل (۴) پشته‌ای
- ۴۰- کدام صفت کمتر تحت تأثیر استرس گرمایی قرار می‌گیرد؟
 (۱) تعداد سنبله (۲) تعداد گلچه (۳) وزن دانه (۴) تعداد دانه
- ۴۱- شعار «خاک را تغذیه کنید تا جامعه سالمی داشته باشید» سرلوحه کدام یک از روش‌های کشاورزی پایدار است؟
 (۱) جنگل زراعی (۲) کشاورزی دقیق (۳) کشاورزی ارگانیک (۴) کشاورزی حفاظتی
- ۴۲- یکی از روش‌های کشت در نظام جنگل زراعی، کشت چند اشکوبه متوالی (Sequential multistrata system) می‌باشد که در آن کشت می‌شوند.
 (۱) گیاهان بوته‌ای و درختی با اندازه‌های مختلف با هم
 (۲) گیاهان زراعی چند ساله خصوصاً بوته‌ها و گیاهان کفزی با درختان غیر شمر
 (۳) گیاهان مرتعی در کف و گیاهان بوته‌ای در اشکوب بالاتر و درختان در حاشیه
 (۴) گیاهان یک ساله در زیر اشکوب چند لایه درختان با اندازه، شکل و موارد مصرف مختلف
- ۴۳- وابستگی به روش‌های برای مبارزه با علف‌های هرز و حفظ حداقل درصد از بقایای محصول روی زمین از ویژگی‌های کشاورزی حفاظتی است.
 (۱) مکانیکی - ۳۰ (۲) شیمیایی - ۳۰ (۳) مکانیکی - ۵۰ (۴) شیمیایی - ۸۰
- ۴۴- روغن کدام گیاه روغنی در مقابل اکسید شدن مقاوم‌تر است؟
 (۱) کتجد (۲) سویا (۳) گلرنگ (۴) بادام زمینی
- ۴۵- در ارتباط با زراعت گندم، کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟
 (۱) توسعه کشت گندم در عرض‌های جغرافیایی بالاتر به توانایی زمستان گذرانی آن دارد.
 (۲) توسعه کشت گندم در عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر، وابسته به امکان ورنالیزه شدن آن دارد.
 (۳) چون ارقام بهاره نیاز به بهاره شدن کمتری دارند لذا عملکرد آن‌ها از ارقام زمستانه بیشتر است.
 (۴) کاشت زود هنگام و بلوغ زودرس هر دو، برای کمک به فرار گندم از خشکی اواخر فصل توصیه می‌شود.

- ۴۶- در نظام‌های زراعی غله - مرتع (Ley farming) در مناطق خشک و نیمه خشک از استفاده می‌شود.
- (۱) گیاهان پوششی به منظور از بین بردن علف‌های هرز در تناوب
 - (۲) گیاهان مقاوم به سرما به منظور حفاظت از غله در کشت مخلوط
 - (۳) شبدر یکساله به منظور تولید علوفه و احیاء حاصلخیزی خاک در دوره ایش
 - (۴) یونجه یکساله به منظور تولید علوفه و احیاء حاصلخیزی خاک در دوره ایش
- ۴۷- از علائم مقاوم شدن غلات زمستانه به سرما می‌توان کدام تغییرات فیزیولوژیکی زیر را برشمرد؟
- (۱) وجود برگ‌های تیره‌تر و فشردتر توأم با کاهش درصد رطوبت گیاه
 - (۲) وجود برگ‌های تیره‌تر و فشردتر توأم با افزایش درصد رطوبت گیاه
 - (۳) وجود برگ‌های روشن‌تر و باریک‌تر که حاوی درصد رطوبت بالایی باشند.
 - (۴) وجود برگ‌های روشن‌تر و باریک‌تر که حاوی درصد رطوبت کمی باشند.
- ۴۸- در رابطه با گل‌رنگ کدام گزینه صحیح‌تر است؟
- (۱) گیاهی مقاوم به شوری و خشکی است.
 - (۲) آبیاری آن باید حتماً به صورت نشتی انجام شود.
 - (۳) ارقام دو فصله آن به سرما حساس‌اند و به بهاره‌سازی نیاز دارند.
 - (۴) بوته‌های آن پس از سبز شدن رشد عمودی خود را آغاز می‌کنند.
- ۴۹- شبدر قرمز ماموت در مقایسه با شبدر قرمز متوسط بوده و در هر سال برداشت می‌شود.
- (۱) دیررس‌تر - دو بار (۲) دیررس‌تر، یک بار (۳) زودرس‌تر، دو بار (۴) زودرس‌تر، یک بار
- ۵۰- شبدر لاکی دارای خصوصیات رشدی بوده و بیشترین تولید را در شرایط آب و هوایی دارد.
- (۱) خزنده - سرد و مرطوب (۲) خزنده - گرم و مرطوب (۳) عمودی - سرد و مرطوب (۴) عمودی - گرم و مرطوب
- ۵۱- تنش اکسیداتیو در گیاهان زراعی عمدتاً در شرایط مواجهه گیاه با رخ می‌دهد.
- (۱) تنش سرما و گرما
 - (۲) تنش خشکی و شوری
 - (۳) کثر تنش‌های غیر زنده
 - (۴) تنش عناصر سنگین و ماوراء بنفش
- ۵۲- تنش خشکی در کدام مرحله از رشد و نمو گیاه گندم بیشترین تأثیر را در تعداد سنبلچه در سنبله دارد؟
- (۱) گلدهی (۲) پنجه‌زنی (۳) پر شدن دانه (۴) تورم برگ پرجمی
- ۵۳- در حبوبات سرعت رشد دانه، تنوع دارد.
- (۱) کمتری از دوره‌ی پر شدن دانه
 - (۲) بیشتری از دوره‌ی پر شدن دانه
 - (۳) کمتری از شاخص سطح برگ
 - (۴) بیشتری از گونه تثبیت کننده نیتروژن
- ۵۴- گیاه راتون گیاهی است که مانند است.
- (۱) بعد از گیاه اصلی کشت شود - یونجه یک سانه
 - (۲) بعد از برداشت مجدداً رشد نماید - ذرت
 - (۳) بعد از برداشت رشد نماید - گندم
 - (۴) بعد از برداشت مجدداً رشد نماید - برنج
- ۵۵- کدام گزینه شامل پاسخ گیاهان به افزایش دی‌اکسیدکربن نمی‌باشد؟
- (۱) افزایش فتوسنتز
 - (۲) افزایش هدایت روزنه‌ای
 - (۳) افزایش شاخه‌دهی و تعداد گره‌ها
 - (۴) گسترش برگ‌های بزرگ‌تر و ضخیم‌تر و سنگین‌تر
- ۵۶- در غلات سه دوره رشد اساسی قابل تشخیص است (دوره رشد رویشی - دوره رشد زایشی - دوره پر شدن دانه)، کدام‌یک در دوره رشد زایشی اهمیت کمتری از نظر مخزن بودن (sink) دارد؟
- (۱) میانگره‌ها (۲) ریشه‌ها و پنجه‌ها (۳) گل آذین‌های در حال نمو (۴) برگ‌های موجود در بالای ساقه
- ۵۷- چرا در غلات انتقال مواد فتوسنتزی از برگ‌ها به ریشه، با پیشرفت سن گیاه در طول پر شدن دانه کاهش می‌یابد؟
- (۱) پیری و مرگ ریشه
 - (۲) افزایش باز گسیل آسمیلات از ساقه به ریشه
 - (۳) افزایش یافتن برگ‌های پائینی بوته
 - (۴) ایجاد مقصدهای تازه (اندام‌های قابل برداشت) در گیاه
- ۵۸- مواد غذایی ساخته شده در گندم در زمان پر شدن دانه قبل از ورود به دانه در کجا ذخیره می‌شوند؟
- (۱) ساقه (۲) ساقه و ریشه (۳) ساقه و پهنک برگ (۴) ساقه، غلاف و پهنک برگ
- ۵۹- اندازه‌گیری زمان در پاسخ فتوپریودی گیاهان براساس آخرین فرضیات موجود، صرفاً توسط انجام می‌گیرد.
- (۱) فیتوکروم صورت می‌گیرد.
 - (۲) ساعت بیولوژیک صورت می‌گیرد.
 - (۳) هورمون‌های گیاهی صورت می‌گیرد.
 - (۴) فیتوکروم صورت نگرفته و ساعت بیولوژیک نیز در آن پهنای نقش می‌کند.
- ۶۰- Circadian rhythm در گیاهان به ریتم‌های درونی که دارای طول هستند گفته می‌شود.
- (۱) حداکثر چند ساعت (۲) تقریبی یک ساله (۳) تقریبی ۲۴ ساعته (۴) تقریبی ۲۸ روزه

- ۶۱- در مقاومت گیاهان به شرایط آب گرفتگی
- ۱) هم اکلیماسیون بیوشیمیایی و هم اکلیماسیون آناتومیکی می‌توانند نقش داشته باشند.
 - ۲) منظور از اکلیماسیون بیوشیمیایی مرگ برنامه‌ریزی شده سلول‌ها می‌باشد.
 - ۳) اکلیماسیون آناتومیکی نقش ندارد.
 - ۴) اکلیماسیون بیوشیمیایی نقش ندارد.
- ۶۲- در مورد افزایش تحمل و عملکرد گیاه زراعی به کمبود آب، کدام یک از موارد زیر مناسب‌تر است؟
- ۱) از طریق افزایش غلظت فروکتوز (fructose) و گالاکتوز (galactose)
 - ۲) از طریق افزایش غلظت نشاسته (amidon) و ساکارز (sucros)
 - ۳) از طریق افزایش غلظت تروهالوز (trehalose) و فروکتان (fructan)
 - ۴) از طریق افزایش غلظت ساکارز (sucrose) و پرولین (proline)
- ۶۳- کدام گزینه در مورد انتقال مواد در فلوم صحیح می‌باشد؟
- ۱) گیاهان با بارگیری آپوپلاستیک، در سرما از قدرت تحرک ساکارزی بهتری برخوردار هستند و گیاهان با بارگیری سیمپلاستیک، در گرما از قدرت تحرک رافینوزی برخوردار می‌باشند.
 - ۲) گیاهان با بارگیری آپوپلاستیک، در گرما از قدرت تحرک رافینوزی برخوردار هستند و گیاهان با بارگیری سیمپلاستیک، در سرما از قدرت تحرک ساکارزی برخوردار می‌باشند.
 - ۳) گیاهان با بارگیری آپوپلاستیک، در گرما از قدرت تحرک ساکارزی بهتری برخوردار هستند و گیاهان با بارگیری سیمپلاستیک، در سرما از قدرت تحرک رافینوزی برخوردار می‌باشند.
 - ۴) نوع بارگیری آپوپلاستی و سیمپلاستی اصولاً دخالتی در حرکت مواد با ساختاری خاص را ندارد.
- ۶۴- شدت تنفس در گیاه
- ۱) در سازگاری به سرما و به گرما هم ارز می‌شود.
 - ۲) سازگار به گرما، کاهش، و سازگار به سرما، افزایش می‌یابد.
 - ۳) سازگار به گرما، کاهش، و سازگار به سرما، کاهش می‌یابد.
- ۶۵- ممانعت از فعالیت آنزیمی در سلول برگی، بطور مؤثر از اجرای تنفس نوری جلوگیری می‌کند.
- ۱) گلیسرال کیناز
 - ۲) ترانس آمیناز
 - ۳) فسفوگلیکولات فسفاتاز
 - ۴) سیرین گلی‌اکسیلات آمینوترانسفراز
- ۶۶- متابولیت‌های ثانویه در گیاهان تولید می‌شوند.
- ۱) در اثر تنفس نوری
 - ۲) در پاسخ به تنش‌های محیطی
 - ۳) در پاسخ به آسیمیلایسیون کربوهیدرات‌ها
 - ۴) در پاسخ به آسیمیلایسیون لیپیدها
- ۶۷- پروتئین از این جهت در متابولیسم گیاهان اهمیت دارند که در نقش دارند.
- ۱) آنزیم‌ها و تبادل سلولی
 - ۲) انتقال انرژی سلولی
 - ۳) ساختار هورمون‌ها
 - ۴) پیشبرد فرآیند فتوسنتز
- ۶۸- رشد در سلول‌های حیوانی عمدتاً نتیجه و در سلول‌های گیاهی عمدتاً حاصل می‌باشد.
- ۱) افزایش پروتوپلاسم و سنتز پروتئین - جذب آب و توسعه دیواره سلولی
 - ۲) جذب آب و توسعه پلاسم ممبران - جذب آب و سنتز پروتوپلاسم
 - ۳) افزایش پروتوپلاسم و سنتز پروتئین - افزایش پروتوپلاسم و توسعه دیواره سلولی
 - ۴) سنتز کربوهیدرات‌ها، پروتئین و روغن - افزایش پروتوپلاسم و توسعه دیواره سلولی
- ۶۹- رابطه همی سلولز در دیواره سلولی چگونه است؟
- ۱) همی سلولز به صورت یک شبکه فیبرهای سلولزی را به هم وصل می‌کند.
 - ۲) سلولز و همی سلولز با هم متصل شده و میکرو فیبریل‌ها را ایجاد می‌کند.
 - ۳) با پیشرفت سن سلول سلولز تدریجاً به همی سلولز تبدیل می‌شود.
 - ۴) همی سلولز به صورت میکروفیبریل‌هایی در ماتریکسی از سلولز قرار گرفته است.
- ۷۰- پلی‌مرهای دیواره سلولی پس از ترشح به بیرون از سلول توسط کدام گروه آنزیمی مونتاژ (assemble) و یا به عبارت دیگر تجدید آرایش می‌یابند؟
- ۱) گلوکانازها
 - ۲) زایلویدازها
 - ۳) زیلوگلوکان هیدرولازها
 - ۴) زیلوگلوکان اندوترانس گلیکوزیلازها
- ۷۱- اکسپنسیون‌ها (Expansins) چه نقشی در رشد سلول دارند؟
- ۱) آنزیم‌های مهم در سنتز مواد دیواره سلولی هستند.
 - ۲) در توسعه رشد اسیدی و رهائی از استرس (stress relaxation)
 - ۳) پروتئین‌هایی هستند که دریافت سیگنال‌های درونی گیاه جهت توسعه سلول نقش دارند.
 - ۴) پروتئین‌های ساختمانی هستند که با قرار گرفتن لابلای سلولز و همی سلولز باعث توسعه دیواره سلولی می‌شوند.

- ۷۲- در مکانیزم عمل هورمون‌ها، هورمون به گیرنده متصل شده و سپس کمپلکس هورمون - گیرنده سبب فعال‌سازی G - پروتئین شده و این ترکیب سبب تحریک آدنیلات سیکلاز می‌شود که در نهایت باعث تحریک CAMP می‌گردد. در این فرآیند پیک‌های اولیه و ثانویه به ترتیب کدام‌اند؟
 (۱) هورمون - G پروتئین
 (۲) هورمون - CAMP
 (۳) آدنیلات سیکلاز - CAMP
 (۴) کمپلکس هورمون - گیرنده - G پروتئین
- ۷۳- در حرکت قطبی اکسین، ورود اکسین به درون سلول جهت انتقال چگونه است؟
 (۱) ورود IAAH از طریق کانال ویژه
 (۲) ورود IAA⁻ از طریق کانال ویژه
 (۳) ورود IAAH از طریق انتشار و ناقل ویژه
 (۴) ورود IAA⁻ از طریق انتشار و ناقل ویژه
- ۷۴- کدام هورمون نقش عمده‌ای در فرآیند جاذبه گرایی دارد؟
 (۱) سیتوکینین
 (۲) ABA
 (۳) جیبرلین
 (۴) اکسین
- ۷۵- محدود بودن عملکرد پتانسیل در بسیاری از گیاهان زراعی به دلیل کم بودن است.
 (۱) جذب نور در محدوده فعال فتوسنتزی
 (۲) ضریب تبدیل بیوماس به عملکرد اقتصادی
 (۳) ضریب تبدیل انرژی نورانی به شیمیایی
 (۴) جذب نور توسط کانوبی گیاه
- ۷۶- علت اینکه گیاهان دارای مسیر فتوسنتزی CAM، ساختار گوشتی و آبدار هستند این است که ضروری است.
 (۱) آب زیادی برای تعرق در روز
 (۲) سلول حجیم برای جذب نور بیشتر
 (۳) یک واکنش بزرگ برای ذخیره اسید مالیک تولید شده در شب
 (۴) سیتوپلاسم بزرگ برای ذخیره اسید مالیک تولید شده در شب
- ۷۷- رابطه بین افزایش هورمون و میزان رشد گیاه عموماً است.
 (۱) آبیسیک اسید - مثبت
 (۲) اکسین - منفی
 (۳) سیتوکینین - مثبت
 (۴) اتیلن - مثبت
- ۷۸- ساختار اصلی مولکول DNA در سلول‌های گیاهی شامل است.
 (۱) یک گروه فسفات یک قند پنج کربنه و یک باز
 (۲) اسیدهای هسته‌ای و گروه‌های پلی پتیید
 (۳) یک گروه فسفات یک اسید آمینه و یک اسید هسته‌ای
 (۴) یک مولکول RNA - یک گروه فسفات و یک باز
- ۷۹- آنزیم‌های گیاهی عموماً بوده و نقش دارند.
 (۱) هورمون - آنالیزوری
 (۲) پروتئین - کاتالیزوری
 (۳) پروتئین - آنالیزوری
 (۴) هورمون - کاتالیزوری
- ۸۰- پتانسیل آب محلول خاک در شرایط
 (۱) نب منفی‌تر از پتانسیل آب برگ است.
 (۲) بدون تنش مثبت‌تر از پتانسیل آب برگ است.
 (۳) بدون تنش منفی‌تر از پتانسیل آب برگ است.
 (۴) تنش آب شدید مثبت‌تر از پتانسیل آب برگ است.