

۱۶۷

F



167F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

صبح جمعه  
۹۳/۱۲/۱۵  
دفترچه شماره ۱۱ از ۲

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل - سال ۱۳۹۴

### علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی (کد ۲۴۱۴)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، اصول مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی - شیمی مواد غذایی تکمیلی، فرایند مواد غذایی تکمیلی، روش‌های نوین آزمایشگاهی)	۸۰	۱	۸۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفند ماه - سال ۱۳۹۳

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حرفی و حقوقی تنها با عجز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برابر مقررات رقاب می‌شود.

- ۱ عامل فساد پوسیدگی خاکستری (Gray rot) در برخی از سبزی‌ها مانند سیر و پیاز کدام است؟  
 (۱) *Botrytis cinerea* (۲) *Erwinia carotovora*  
 (۳) *Xanthomonas campestris* (۴) *Geotrichum candidum*
- ۲ کدام مورد از روش‌های ایمنولوژیکی شمارش میکروب‌ها است؟  
 (۱) Radiometry (۲) ATP assay  
 (۳) Thermostable nuclease (۴) Fluorescent antibody
- ۳ عامل ایجاد نقاط سیاه رنگ در پوست موز کدام است؟  
 (۱) *Colletotrichum muscae* (۲) *Colletotrichum coccodes*  
 (۳) *Streptomyces* spp. (۴) *Xanthomonas campestris*
- ۴ نژادهای کدامیک از گروه‌های اشیرشیاکلای، قادر به تولید سمی مشابه سم کلرا است؟  
 (۱) Enteropathogenic *E. coli* (۲) Enterotoxigenic *E. coli*  
 (۳) Enteroinvasive *E. coli* (۴) Enteropathogenic *E. coli*
- ۵ کدام ترکیب، ممکن است توسط میکروارگانیسم‌ها تولید شده و موجب کاهش پتانسیل اکسیداسیون و احیاء مواد غذایی شود؟  
 (۱) پرولین (۲) گلوتاتیون  
 (۳) ویتامین‌های گروه B (۴) سولفید هیدروژن ( $H_2S$ )
- ۶ دکستران عمدهاً توسط کدام جنس باکتریایی تولید می‌شود؟  
 (۱) لاکتوباسیلوس (۲) پدیوکوکوس (۳) لوکونوستوک (۴) استرپتوکوکوس
- ۷ اندوتوكسین در باکتری *Salmonella typhimurium* دارای چگونه ساختاری است؟  
 (۱) پروتئینی (۲) پلی‌ساکاریدی (۳) گلیکو‌پروتئینی (۴) لیپوپلی‌ساکاریدی
- ۸ انجام کدام آزمون، برای تایید استافیلوکوکوس اورتوس بر پرگنهای مشکوک رشد یافته در محیط کشت ضروری است؟ **Baird-Parker**  
 (۱) فعالیت کاتالازی (۲) فعالیت کواگولازی (۳) فعالیت پروتئولتیکی (۴) فعالیت لیپولتیکی
- ۹ لیزوژیم و سیستم لاکتوپراکسیداز به ترتیب چه گروهی از باکتری‌ها را بیشتر تحت تأثیر اثرات ضدمیکروبی خود قرار می‌دهند؟  
 (۱) گرم منفی - گرم منفی (۲) گرم مثبت - گرم مثبت  
 (۳) گرم منفی - گرم مثبت (۴) گرم مثبت - گرم مثبت
- ۱۰ کدام باکتری، در شرایط مناسب رشد، دارای زمان تقسیم کوتاه‌تری است؟  
 (۱) *Escherichia coli* (۲) *Salmonella senftenberg*  
 (۳) *Clostridium perfringens* (۴) *Mycobacterium tuberculosis*
- ۱۱ کدام اسید شکل هیدروژن دار شده اسید دیگر است؟  
 (۱) اروسیک - اولئیک (۲) اولئیک - اروسیک (۳) بهینیک - اروسیک (۴) واکسینیک - اولئیک
- ۱۲ کدام اسید، شکل مزدوج شده اسید لینولنیک است؟  
 (۱) اروسیک (۲) واکسینیک (۳) ۷ - لینولنیک (۴) اولئو استئاریک
- ۱۳ سسامین و سسامولین مستول واکنش‌های رنگی کدام روغن هستند؟  
 (۱) کنجد (۲) زیتون (۳) پنبه‌دانه (۴) سبوس برنج
- ۱۴ محلول ترین قند کدام است؟  
 (۱) مالتوز (۲) فروکتوز (۳) گلوكز (۴) ساکاروز
- ۱۵ بیشترین میزان تولید آب در بدن، ناشی از اکسایش کدام ماده است؟  
 (۱) روغن (۲) قند (۳) فیبر (۴) گوشت
- ۱۶ کدام عنصر می‌تواند با روتین ترکیب کئوردینانس سیاه رنگی تشکیل دهد؟  
 (۱)  $Fe^{+++}$  (۲)  $Fe^{++}$  (۳)  $Cu^{++}$  (۴)  $Cu^+$

- ۱۷ - گلوسید اصلی در اندام حیوان، شیر، ذخیره حیوانی و ذخیره گیاهی کدام است؟

- (۱) فروکتوز - لاکتوز - سلولز - نشاسته  
 (۲) گلوکز - لاکتوز - گلیکوژن - نشاسته  
 (۳) گلوکز - گالاکتوز - گلیکوژن - سلولز  
 (۴) فروکتوز - گالاکتوز - سلولز - گلیکوژن

- ۱۸ - ایزومرهای آنومری و اپیمری به ترتیب چگونه حاصل می‌شوند؟

- (۱) اختلاف در آرایش کربن ۱ و اختلاف در آرایش یک کربن  
 (۲) اختلاف در آرایش یک کربن و اختلاف در آرایش کربن ۱  
 (۳) اختلاف در عامل آلدئیدی و اختلاف در عامل کتونی قندها

(۴) اختلاف در شکل فضایی صندلی و اختلاف در شکل فضایی قایق قندها

- ۱۹ - در نامیدن شکل‌های ایزومری تری گلیسریدهای مرکب (درهم) در ابتدا چه چیزی ذکر می‌شود؟

- (۱) بلندترین زنجیر  
 (۲) کوتاهترین زنجیر  
 (۳) سیرنشده‌ترین زنجیر

- ۲۰ - از هیدروژن دهی زیستی اسیدهای چرب چند سیر نشده (PUFA) کدام اسید چرب پدید می‌آید؟

- (۱) بھینیک  
 (۲) الایدیک  
 (۳) ترانس واکسینیک اسید  
 (۴) سیس واکسینیک اسید

- ۲۱ - یک سیال غذایی در یک دستگاه تبادل حرارتی با خصوصیات قطر لوله  $D = 5\text{cm}$  و ضریب هدایت حرارت

$$k = \frac{W}{m^{\circ}C} \quad \text{و عدد ناسلت برابر } 15^{\circ}, \text{ از دمای } 20^{\circ} \text{ به دمای } 4^{\circ} \text{ درجه سانتی‌گراد خنک شده است.}$$

(ضریب انتقال حرارتی) کدام است؟

$$15 \frac{W}{m^{\circ}K} \quad (1)$$

$$15 \frac{W}{cm^{\circ}C} \quad (2)$$

$$1500 \frac{W}{m^{\circ}K} \quad (3)$$

$$1500 \frac{W}{cm^{\circ}C} \quad (4)$$

- ۲۲ - اگر ماده‌ای با  $8^{\circ}$  درصد رطوبت، بعد از خشک شدن به ماده‌ای با  $5^{\circ}$  درصد رطوبت تبدیل شود، کاهش وزن

آن چند درصد خواهد بود؟

(۱)  $3^{\circ}$

(۲)  $4^{\circ}$

(۳)  $5^{\circ}$

(۴)  $6^{\circ}$

- ۲۳ - منظور از «شار» یا Flux کدام است؟

(۱) جرم عبور یک سیال بر واحد سطح

(۲) جرم عبور یک سیال بر واحد زمان

(۳) جرم عبور یک سیال بر واحد زمان بر واحد سطح

(۴) جرم عبور یک سیال بر واحد زمان بر واحد حجم

- ۲۴- فشار مطلق در داخل یک تبخیر گننده که دارای فشار خلاء ۳۸ سانتیمتر جیوه می‌باشد، بر حسب کیلو پاسکال تقریباً چقدر است؟ (فشار محیط را یک اتمسفر در نظر بگیرید.)

(۱) ۲۵/۲۵

(۲) ۵۰/۵

(۳) ۱۰۱

(۴) ۱۵۱

- ۲۵- اگر در یک لیتر آب گوجه فرنگی، مقدار ۷۰ گرم مواد جامد محلول وجود داشته باشد و چگالی آن نیز برابر

$$\frac{g}{cm^3} \quad 1/4 \text{ باشد، بریکس این محلول چقدر است؟}$$

(۱) ۱/۴

(۲) ۵

(۳) ۷

(۴) ۱۴

- ۲۶- معادله‌ای که برای بیان «نیمه عمر» یک ترکیب (زمان لازم جهت کاهش غلظت ترکیب مورد نظر به نصف مقدار اولیه) استفاده می‌شود، کدام است؟

$$C = C_0 [2]^{\frac{-t}{t_0/2}} \quad (1)$$

$$C = C_0 [2]^{\frac{t_0/2}{t}} \quad (2)$$

$$C = C_0 [2]^{\frac{+t}{t_0/2}} \quad (3)$$

$$C = C_0 [2]^{\frac{t_0/2}{-t}} \quad (4)$$

- ۲۷- به ترتیب برای سه سیستم ۱) سیستم کلوبیدی حاوی ذرات با بار همنام و نیز ویسکوزیته بالا ولی میزان ذرات کم ۲) سیستم حاوی ذرات معلق با تمایل هیدروفوبیک نسبت به یکدیگر و ویسکوزیته کم و ۳) سیستم حاوی میزان ذرات معلق بسیار بالا، کدام روش جداسازی مکانیکی مناسب‌تر است؟

(۱) فیلتر پرس، دکانتور، فیلتر خلاء

(۳) فیلتر خلاء، دکانتور، فیلتر پرس، فیلتر خلاء

- ۲۸- به ترتیب کاهش اندازه ذرات چربی و افزایش ماده جامد سیستم امولسیونی مانند شیر، چه اثری بر کارایی جداسازی سانتریفوژ دارد؟

(۱) کاهش، افزایش      (۲) افزایش، کاهش      (۳) کاهش ، بدون تأثیر      (۴) کاهش ، کاهش

- ۲۹- نیروی محرکه خروج رطوبت از مواد غذایی هنگام خشک کردن، کدام است؟

(۱) اختلاف دمای بین سطح و داخل محصول

(۲) اختلاف انتالپی بین سطح ماده غذایی و محیط اطراف

(۳) اختلاف انتروپی بین سطح ماده غذایی و محیط اطراف

(۴) اختلاف فشار بخار آب بین سطح ماده غذایی و محیط اطراف

- ۳۰- اگر هوای محیط را گرم کرده از دمای  $10^{\circ}$  درجه به  $100^{\circ}$  درجه سانتی گراد برسانیم و از خشک کن عبور دهیم و دمای خروجی از خشک کن  $5^{\circ}$  درجه باشد، کدام تغییرات در ارتباط با هوای قبل و بعد از خشک کن صحیح است؟
- (۱) دانسیته و رطوبت مطلق افزایش و نقطه شبنم کاهش یافته است.
  - (۲) رطوبت مطلق، رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم افزایش یافته است.
  - (۳) انتالپی و نقطه شبنم افزایش ولی رطوبت مطلق کاهش یافته است.
  - (۴) دماهای خشک و تر هر دو کاهش و نقطه شبنم افزایش یافته است.
- ۳۱- خصوصیات منحصر به فرد گلوتون در گندم، تحت تأثیر وجود کدام اسیدهای آمینه است؟
- (۱) آسپارژین و سیستئین
  - (۲) گلوتامیک اسید و تیروزین
  - (۳) پرولین و آسپارژین
  - (۴) متیونین و فنیل آلانین
- ۳۲- جهت بررسی میزان تأثیر یک فرآیند بر نشاسته یک فرآورده غلاتی، کدام ویژگی از نشاسته را می‌توان به عنوان شاخص، مورد ارزیابی قرار داد؟
- (۱) بلورینگی (Crystallinity)
  - (۲) میزان آمیلوز و آمیلوپکتین (Retorgradation)
  - (۳) بایر فرینجنس (Birefringence)
  - (۴) منظور از اصطلاح فوت (Foot) کدام است؟
- ۳۳- (۱) صابون جمع شده در مخازن تصفیه قلیایی
- (۲) پودر حاصل از گداز مواد جامد
  - (۳) رسوب فسفاتیدهای حاصل از مرحله صمع‌گیری
  - (۴) ضایعات خارج شده همراه بخار استریپینگ در مرحله بوجیری
- ۳۴- کدام روغن گیاهی به عنوان ماده اولیه برای تولید اسیدلینولئیک مزدوج (CLA) استفاده می‌شود؟
- (۱) سویا
  - (۲) کنجد
  - (۳) ذرت
  - (۴) گلنگ
- ۳۵- کدام آزمایش، برای تعیین آب اضافه شده به شیر انجام می‌شود؟
- (۱) آزمایش جوش
  - (۲) تعیین اسیدیته شیر
  - (۳) تعیین نقطه انجماد شیر
  - (۴) اندازه‌گیری نسبت چربی به پروتئین
- ۳۶- در کره سازی به چه منظور، دمای پاستوریزاسیون خامه ترش بیشتر از خامه شیرین است؟
- (۱) تولید کره معطر
  - (۲) جلوگیری از ورود مس از سرم به داخل چربی
  - (۳) افزایش ماندگاری کره
  - (۴) ایجاد محیط مناسب و بدون رقیب برای فعالیت باکتری‌های لاکتیک
- ۳۷- در اثر فعالیت کدام میکرووارگانیسم، لوان (Levan) ساخته می‌شود؟
- |                                 |     |                            |     |
|---------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| <i>Clostridium botulinum</i>    | (۲) | <i>Bacillus subtilis</i>   | (۱) |
| <i>Leuconostoc mesentroides</i> | (۴) | <i>Aceticacid bacteria</i> | (۳) |
- ۳۸- اگر درصد ضایعات قندی گل کربناسیون نسبت به چند درصد مصرفی  $36/0$  درصد و درصد قند گل کربناسیون  $3/0$  درصد باشد، درصد آهک مصرفی در تصفیه شربت خام نسبت به چند درصد مصرفی چقدر است؟
- (۱)  $1/5$
  - (۲)  $2/5$
  - (۳)  $2/5$
  - (۴)  $3/5$
- ۳۹- دلیل اصلی استفاده نکردن از سیب‌های بیش از حد رسیده در تهیه آب سیب کدام است؟
- (۱) داشتن قند کم
  - (۲) داشتن پاتولین زیاد
  - (۳) ایجاد تفاله چسبنده و کاهش راندمان آبدهی
  - (۴) داشتن پکتین بالا و کاهش راندمان آبدهی
- ۴۰- در اتوکلاو نوع **Continuous Agitation Retort** کدام قسمت دستگاه، هم حالت تحت فشار و هم حالت فشار اتمسفریک را دارد؟
- |                         |     |                       |     |
|-------------------------|-----|-----------------------|-----|
| <i>Cooler shell</i>     | (۲) | <i>Cooker shell</i>   | (۱) |
| (۴) همه قسمت‌های دستگاه |     | <i>Feeding device</i> | (۳) |

- ۴۱ در تماس بسته‌بندی با کدام نوع غذاها، احتمال مهاجرت مواد با وزن مولکولی کم و فرار وجود دارد؟  
 ۱) چرب ۲) خشک ۳) اسیدی ۴) آبی و نوشابه‌ها
- ۴۲ روغن‌های کانی در جذب کدام ماده اختلال ایجاد می‌کنند؟  
 ۱) کاروتون ۲) تیامین ۳) ویتامین C ۴) ریبوفلاوین
- ۴۳ نوع امولسیونی که انواع لیستین تشکیل می‌دهند کدام است؟  
 ۱) لیستین خام (W/O) ۲) لیستین هیدروکسیلی شده (O/W)  
 ۳) لیستین محلول در اتانول (O/W) ۴) لیستین هیدروکسیلی شده (W/O)
- ۴۴ محصول اصلی تولید شده از اکسیداپیون اسیدهای چرب که با اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها واکنش می‌دهد و معیاری برای سنجش فساد می‌باشد کدام است؟  
 ۱) پراکسیدها ۲) کتو اسیدها ۳) مالون دی‌آئدید ۴) اسیدهای چرب آزاد
- ۴۵ اسکلت اصلی ساختمان آنتوسبیانین‌ها و فلاونوئیدها به ترتیب کدام ترکیب است؟  
 ۱) آنیدرو باز - چالکون ۲) یون کربنیول - پسودو باز  
 ۳) فلاویلیوم - گلیکوزید ۴) کاتیون فلاویلیوم - فلاویلیوم
- ۴۶ محصول نهایی واکنش قهقهه‌ای شدن اسید آسکوربیک (هوازی و غیرهوازی) کدام است؟  
 ۱) ملانین و آمونیاک ۲) فورفورال و دی‌اسید کربن ۳) اسید لاکتیک و استالدیید  
 ۴) قند آمینی و آلفا دی‌کربونیل
- ۴۷ رنگدانه‌های هیدروکربنی و هیدروکربنی اکسیژن‌دار به ترتیب چه نام دارد؟  
 ۱) کاروتونوئیدها - گزانتوفیل‌ها ۲) گزانتوفیل‌ها - کاروتون  
 ۳) بیکسین - نور بیکسین ۴) کاروتونوئیدها - لیکوپن
- ۴۸ زهری‌ترین شکل جیوه کدام است؟  
 ۱) مرکور فلزی ۲) متیل مرکوری ۳) دی‌متیل مرکوری ۴) مرکوریک کلرید
- ۴۹ پاسخ زهری که با آزمایش‌های تغذیه‌ای جانوری چهار هفته به درازا کشد چه نوع زهر آگینی است؟  
 ۱) حاد ۲) مزمن ۳) زیر حاد ۴) زیر مزمن
- ۵۰ رادیوایزوتوپی که نشر دهنده گاماست و در بافت ماهیچه‌ای جمع می‌شود کدام است؟  
 ۱)  $C^{14}$  ۲)  $I^{131}$  ۳)  $Sr^{90}$  ۴)  $Cs^{137}$
- ۵۱ وجود کدام گروه‌ها در ستون مهراهی سلولز به حل‌پذیری صمغ آن در آب کمک می‌کند؟  
 ۱) استیل ۲) کربوکسیل ۳) کربوکسی متیل ۴) متیل اتر
- ۵۲ کدام اسید، سیر نشده است؟  
 ۱) فوماریک ۲) مالیک ۳) سیتریک ۴) سوکسینیک
- ۵۳ اولئو روپیین، عامل تلخی زیتون سبز چه ترکیبی است؟  
 ۱) الکلی ۲) گلوکزید استر ۳) استراولئیک اسید ۴) استر داخلی هیدروکسی تیروزول و اسید اولئیک
- ۵۴ با اتصال کدام گروه‌های پلی‌فسفاتی گوشت و با حمل مولکول‌های آب جذب شده، موجب افزایش ظرفیت نگهداری آن می‌شوند؟  
 ۱) آبگرا ۲) آبگریز ۳) دارای بار مثبت ۴) دارای بار منفی
- ۵۵ کدام مورد در خصوص انتقال حرارت در کنسروسازی درست است؟  
 ۱) کنسروهای جامد سریع‌تر از کنسروهای نیمه جامد گرم می‌شوند.  
 ۲) وجود هوا در بخار آب، ضریب انتقال گرمایی جایه‌جایی را افزایش می‌دهد.  
 ۳) چارت هسلر دمای مرکز قوطی کنسرو را در شرایطی که عدد فوریه بزرگ‌تر از  $2/2^{\circ}$  است، نشان می‌دهد.  
 ۴) کنسرو مواد غذایی با ضریب نفوذ حرارتی بالا، نیاز به زمان بیشتری دارد تا با محیط حرارتی به تعادل برسد.

-۵۶- کدام فرآیند درست است؟

- (۱) فرآیند اهمیک (Ohmic process) روش فرآوری حرارتی مناسب برای مواد غذایی خشک است.
- (۲) فرآیند فشار بالا (High pressure) باعث شکسته شدن پیوندهای کووالان در ماده غذایی می‌شود.
- (۳) در بکارگیری امواج مایکروویو (Microwave) مقاومت حرارتی مولکول‌های قطبی مواد غذایی، نقش مهم‌تری در سرعت گرم شدن دارد.
- (۴) در فرآوری مواد غذایی با امواج فرا صوت (Ultra sound)، پدیده کاویتاسیون سرعت انتقال جرم در مواد غذایی را افزایش می‌دهد.

-۵۷- کدام مورد در خصوص مقدار F درست‌تر است؟

- (۱) معادله  $F = D(\log a - \log b)$  ارتباط بین مقدار F و تعداد میکرووارگانیسم‌ها را نشان می‌دهد.
- (۲) مقدار F یک فرآیند حرارتی، نشان‌دهنده زمان نگهداری در اتوکلاو برای از بین بردن میکرووارگانیسم هدف است.
- (۳) در محاسبه شدت یک فرآیند حرارتی، مقدار F کل، از مجموع مقادیر F در مرحله گرم کردن و سرد کردن حاصل می‌شود.

$$(4) \text{ معادله } F = \int_0^t \frac{T - T_{ref}}{z} dt$$

فرآیند F فقط هنگامی استفاده می‌شود که دمای نقطه سرد ماده غذایی با گذشت زمان فرایند، تغییر نمی‌کند.

-۵۸- کدام مورد در خصوص انتقال حرارت در فرایندهای غذایی درست است؟

- (۱) فرایند بلانچینگ نخودفرنگی در شرایط پایا صورت می‌گیرد.
- (۲) فرایند استریل کردن مواد غذایی در شرایط ناپایا صورت می‌گیرد.
- (۳) در حین استریل کردن مواد غذایی، فرض می‌شود که دما در سراسر محصول یکنواخت است.
- (۴) جهت سهولت، انتقال حرارت در حین سرخ کردن قطعات مکعبی ماده غذایی را به صورت تک بعدی در نظر می‌گیرند.

-۵۹- کدام فرآیند، اثر کمتری بر کیفیت تغذیه‌ای گوشت دارد؟

- (۱) منجمد کردن در دمای  $-40^{\circ}\text{C}$
- (۲) خشک کردن انجمادی (Freeze drying)
- (۳) پختن با استفاده از مایکروویو
- (۴) کنسرو کردن با استفاده از بخار  $121^{\circ}\text{C}$

-۶۰- کدام عبارت، در ارتباط با فرایند حرارتی قوطی کنسرو درست‌تر است؟

- (۱) با فرض وجود کلستریدیوم بوتولینم، شرایط معمول ماده غذایی و مراحل تولید فرایند حرارتی ۱۲D کافی است.
- (۲) فرآیند ۱۲D برای شرایطی است که نوع ماده غذایی حالت نیمه جامد داشته و احتمال وجود کلستریدیوم بوتولینم در غذا داده شود.

(۳) فرآیند ۱۲D برای حالت‌هایی است که میکرووارگانیزم‌های مقاوم‌تر به حرارت نسبت به کلستریدیوم بوتولینم حضور داشته و شرایط فرآوری قبل از اتوکلاو کنترل شده نیست.

- (۴) در صورتی که اندازه قوطی‌ها از نیم کیلویی بیشتر نباشد و احتمال وجود کلستریدیوم بوتولینم داده شود از ۱۲D استفاده می‌شود و اگر مقاومت میکرووارگانیزم‌ها کمتر باشد، از فرآیند حرارتی کمتری استفاده می‌شود.

-۶۱- اثر فرآیند فشار بالا بر ویسکوزیته ژل نشاسته، چگونه است؟

۱) فشار بالا اثر قابل توجهی بر ویسکوزیته گرانولهای نشاسته ندارد.

۲) فشار بالا موجب اثر غلظت بخشی بیشتر به علت تأثیر بر ملکول نشاسته دارد.

۳) ویسکوزیته نشاسته تحت فشار بالا قرار گرفته، کمتر از نشاسته ژلاتینه شده توسط حرارت است.

۴) ویسکوزیته نشاسته تحت فشار در غلظت‌های کمتر، بیشتر از ویسکوزیته ژل‌های تولید شده با حرارت است.

-۶۲- در استفاده از فشار با سیکل‌های متناوب، کدام حالت، اثر بهتری در از بین رفتن میکرووارگانیزم‌ها دارد؟

$$(1) \text{ ۵۰}^{\circ}\text{C} \text{ و } ۷۰۰\text{ MPa}$$

$$(2) \text{ ۵۵}^{\circ}\text{C} \text{ و } ۸۰۰\text{ MPa}$$

$$(3) \text{ ۶۰}^{\circ}\text{C} \text{ و } ۶۵۰\text{ MPa}$$

$$(4) \text{ ۷۰}^{\circ}\text{C} \text{ و } ۶۰۰\text{ MPa}$$

-۶۳- در ارتباط با یخ‌زدایی (Thawing) قطعات بزرگ گوشت با روش مایکروویو (Microwave)، کدام مورد درست است؟

۱) می‌توان با افزایش توان مایکروویو مشکل ناهمگونی افزایش دما را تا حدودی حل کرد.

۲) به علت زیادتر بودن ضریب اتلاف (Loss factor) آب نسبت به یخ، ناهمگونی در افزایش دمای نقاط مختلف رخ می‌دهد.

۳) به علت زیادتر بودن ضریب اتلاف (Loss factor) یخ نسبت به آب، ناهمگونی در افزایش دمای نقاط مختلف رخ می‌دهد.

۴) با توجه به این که انتقال حرارت به صورت ملکول به ملکول (Conduction) بین ذرات آب و یخ صورت می‌گیرد، شکل ناهمگونی دما کمتر به وجود می‌آید.

-۶۴- از یک آون (Oven) با قدرت تشعشع ۸ کیلو وات، برای حرارت دادن  $100^{\circ}\text{C}$  قطعه ماده غذایی با سطح

$200\text{ cm}^2$  و با ضریب تشعشع (Emissivity) برابر یک استفاده می‌شود. (ضریب استفان - بولتزمن را

$$\frac{5 \times 10^{-8} \text{ J}}{\text{sec m}^2 \text{ k}}$$

مقدار انرژی انتقال چقدر است؟

$$(1) ۳۶۹ \text{ ژول بر ثانیه} \quad (2) ۳۹۶ \text{ ژول بر ثانیه} \quad (3) ۳۶۹۰ \text{ وات} \quad (4) ۳۶۹۰۰ \text{ وات}$$

-۶۵- کدام مورد در ارتباط با همگون‌ساز فراصوت (Ultrasonic homogenizer)، درست است؟

۱) از امواج صوتی با فرکانس بالا بین ۳ تا ۸ کیلوهرتز استفاده می‌شود.

۲) برای همگون‌سازی، از حالت فشار و خلاء و تشکیل حباب‌های هوا در اثر حفرگی (Cavitation) استفاده می‌شود.

۳) برای همگون‌سازی، از حالت بههم‌زندن سریع برای جداسازی و اختلاط ذرات استفاده می‌شود.

۴) از این نوع همگون‌سازی فقط برای اختلاط و همگون‌سازی مایعات در مایعات می‌توان استفاده کرد.

-۶۶- کدام مورد جزو بسته‌بندی پیشرفت‌هه فعل محسوب نمی‌شود؟

۱) وجود ترکیباتی داخل محتوای بسته که موجب جلوگیری از رشد میکرووارگانیزم‌ها می‌شود.

۲) وجود ساکت (Sachet) حاوی ترکیبات جذب کننده اکسیژن داخل سیستم

۳) وجود ترکیباتی داخل بسته که موجب جذب گاز اتیلن برای میوه‌های فرازگرا می‌شود.

۴) وجود یک حس‌گر درون بسته برای تعیین رطوبت همراه با یک ماده جاذب الرطوبه برای محصولاتی که باید سطح رطوبتی خاصی داشته باشند.

- ۶۷- محصول بسته‌بندی شده‌ای در قوطی‌های  $30 \times 40 \times 7$  cm، دارای  $f_h = j_c = 1$  min و  $j_h = 1$  می‌باشد. (با فرض دمای نقطه سرد قوطی در پایان حرارت دهی معادل با  $24^\circ F$ ، دمای اولیه برابر با  $15^\circ F$  و دمای اتوکلاو معادل با  $25^\circ F$ )، زمان فرآیند ( $B_b$ ) بر حسب دقیقه کدام است؟
- (۱) ۸
  - (۲) ۱۰
  - (۳) ۱۲
  - (۴) ۱۵
- ۶۸- کدام مورد از محسن روش‌های رنگ سنجی چشمی است؟
- (۱) به مقدار قابل توجهی نمونه نیاز می‌باشد.
  - (۲) تجهیزات پیشرفته و پیچیده باید فراهم گردد.
  - (۳) حضور یون‌های مزاحم بر سنجش رنگ بی‌تأثیر است.
  - (۴) در مقایسه با روش‌های حجم سنجی سریع‌تر هستند.
- ۶۹- در کروماتوگرافی مایع با کارآبی زیاد و فاز معکوس (RP-HPLC)، مواد موجود در ستون کروماتوگرافی از نوع کدام ترکیبات است؟
- (۱) یونی
  - (۲) قطبی
  - (۳) غیرقطبی
  - (۴) جاذب سطحی
- ۷۰- کروماتوگراف گاز مایع، اسپکتروفوتومتر Vis - UV و اسپکتروفوتومتر جذب اتمی جزء دستگاه‌های تجزیه‌ای هستند که دارای کدام دو قسمت مشترک در هر سه دستگاه می‌باشند؟
- (۱) آشکارساز و ثبات
  - (۲) تکفام ساز و ثبات
  - (۳) منبع نور و آشکارساز
  - (۴) منبع نور و نمونه مایع
- ۷۱- مزیت استفاده از آشکارساز آرایه دیودها (DAD) کدام است؟
- (۱) گستره‌ای از طول موج را پوشش می‌دهد.
  - (۲) آشکارسازی در تک طول موج را سرعت می‌بخشد.
  - (۳) امکان آشکارسازی مقادیر کمتر آنالیت را فراهم می‌سازد.
  - (۴) امکان آشکارسازی دقیق‌تر در تک طول موج را فراهم می‌سازد.
- ۷۲- مخلوطی از ۲ ماده با استفاده از کروماتوگرافی کاغذی جدازاسی می‌شوند. ترکیب با مقدار  $R_f$  بیشتر، به ترتیب از نظر حرکتی و به سطح کاغذ جذب شدن کدام است؟
- (۱) سریع‌تر - شدیدتر
  - (۲) کندتر - شدیدتر
  - (۳) سریع‌تر - ضعیفتر
  - (۴) کندتر - ضعیفتر
- ۷۳- مناسب‌ترین روش برای جدازاسی پروتئینی که به شدت به سوبسترا می‌پیوندد، کدام است؟
- (۱) کروماتوگرافی ژل
  - (۲) کروماتوگرافی افینیتی
  - (۳) مبادله کاتیونی
- ۷۴- کدام عبارت در مورد فاکتور بازداری ( $R_f$ ) ترکیبات در کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) با فاز ساکن سیلیکاژل، درست است؟
- (۱)  $R_f$  ترکیبات غیرقطبی مساوی ترکیبات قطبی است.
  - (۲)  $R_f$  ترکیبات غیرقطبی بیشتر از ترکیبات قطبی است.
  - (۳)  $R_f$  ترکیبات غیرقطبی کمتر از ترکیبات قطبی است.
  - (۴)  $R_f$  ترکیبات، ارتباطی به قطبیت نداشته و ترکیبات آنها بر اساس جذب سطحی جدا می‌شوند.
- ۷۵- در فتوسل‌ها، کاتد بر مبنای کدام اثر پرتوها، الکترون ساطع می‌کند؟
- (۱) میدان
  - (۲) فرکانس
  - (۳) آمپلی‌تیود
  - (۴) فتو الکتریک
- ۷۶- در فتومولتی پلایر تیوب‌ها، داینود (Dynode) به عنوان چیست؟
- (۱) آند
  - (۲) کاتد
  - (۳) منبع ولتاژ
  - (۴) آند و کاتد

- ۷۷- بر طبق معادله Boltzman، با افزایش تعداد سطوح تهییج الکترونیک، تعداد اتم‌های تهییج شده دارای کدام وضعیت است؟
- (۱) کمتر (۲) بیشتر  
(۳) کمتر یا بیشتر (۴) کمتر و بیشتر
- ۷۸- در کدام دستگاه اسپکتروفوتومتری، مکانیسم Sputering اتفاق می‌افتد؟
- (۱) فلوریومتر (۲) فلیم فوتومتر (۳) اتمیک ابزورپشن
- ۷۹- در Grator برای تجزیه پرتوهای مادون قرمز، تعداد Blaze کدام است؟
- (۱) ۱۰ تا ۲۰۰ (۲) ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ (۳) بیش از ۲۰۰۰
- ۸۰- کدام دتکتور کروماتوگرافی گازی، بیشترین حساسیت را برای اندازه‌گیری ترکیبات کلره و سموم کشاورزی دارد؟
- (EC) Electron Capture (۲) (FT) Flame Thermionic (۱)  
(TC) Thermal Conductivity (۴) (FI) Flame Ionization (۳)



